

<p>سكولار</p> <p>تقييم للتدرّب من إعداد سكولار</p>	<p>تقييم الفصل 4 و5: القوى، الترتيب والمقارنة الرياضيات</p> <p>السنة التاسعة من التعليم الأساسي</p>
	<p>المدة: 40 دقيقة</p> <p>العدد: / 20</p>
<p>القسم:</p>	<p>الاسم واللقب:</p>

التمرين 1: قوّة عدد حقيقي دليلها عدد صحيح نسبي (4 ن)

أصنّف حسب الإشارة.

- | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| (1) $(-2)^4$ (0,75 ن) | أ) قوّة موجبة | ب) قوّة سالبة |
| (2) $(-1)^7$ (0,75 ن) | أ) قوّة موجبة | ب) قوّة سالبة |
| (3) $(-1/3)^2$ (0,75 ن) | أ) قوّة موجبة | ب) قوّة سالبة |
| (4) $(-10)^{-1}$ (0,75 ن) | أ) قوّة موجبة | ب) قوّة سالبة |
| (5) $(-5)^0$ (1,0 ن) | أ) قوّة موجبة | ب) قوّة سالبة |

التمرين 2: الترتيب والجمع في IR (4 ن)

أصنّف الاستنتاجات.

- | | | |
|---|----------------|----------------------|
| (1) $a \leq b$ و $a - c \leq b - d \Rightarrow c \leq d$ (0,75 ن) | أ) صحيح دائمًا | ب) ليس صحيحًا دائمًا |
| (2) $a \leq b$ و $a - 3 \leq b - 3 \Rightarrow a \leq b$ (0,75 ن) | أ) صحيح دائمًا | ب) ليس صحيحًا دائمًا |
| (3) $a \leq b$ و $a + d \leq b + c \Rightarrow c \leq d$ (0,75 ن) | أ) صحيح دائمًا | ب) ليس صحيحًا دائمًا |
| (4) $a \leq b$ و $a + c \geq b + c \Rightarrow a \leq b$ (0,75 ن) | أ) صحيح دائمًا | ب) ليس صحيحًا دائمًا |
| (5) $a \leq b$ و $a + c \leq b + d \Rightarrow c \leq d$ (1,0 ن) | أ) صحيح دائمًا | ب) ليس صحيحًا دائمًا |

(أ) صحيح دائمًا

(ب) ليس صحيحًا دائمًا

التمرين 3. مقارنة مقلوبي عددين والمقارنة (4 ن)

π

$$3,1415 \leq \pi \leq 3,1416$$

(1) القيمة المقرّبة بالنقصان إلى 0,001 : (2,0 ن)

(أ) 3,142

(ب) 3,141

(ج) 3,14

(2) القيمة المدوّرة إلى 0,01 : (2,0 ن)

(أ) 3,14

(ب) 3,15

(ج) 3,1

الوضعية الإدماجية: المسافات في الفضاء (8 ن)

تبعد الشمس عن الأرض حوالي **150 000 000 كم**، وسرعة الضوء حوالي **300 000 كم/ث**. وفي حصة الرياضيات حصر التلاميذ العدد 2^7 بين عددين عشريين، ودرسوا كيف تتغيّر متباينة عند ضرب طرفيها في عدد سالب.

(1) الكتابة العلميّة للعدد 150 000 000 : (1,5 ن)

(أ) $1,5 \times 10^8$

(ب) $1,5 \times 10^7$

(ج) 15×10^7

(2) مدّة وصول ضوء الشمس إلى الأرض : (1,5 ن)

(أ) 500 ثانية

(ب) 5000 ثانية

(ج) 50 ثانية

(3) العدد 10^{-3} يساوي : (1,5 ن)

(أ) 0,0001

(ب) 0,001

(ج) -1000

(4) القيمة المقرّبة بالنقصان إلى 10^{-2} للعدد 2^7 : (1,5 ن)

(أ) 1,41

(ب) 1,4

(ج) 1,42

(5) إذا كان $x < 3$ فإنّ : (2,0 ن)

(أ) $x + 1 > 4$

(ب) $-6 < 2x$

(ج) $-6 > 2x$

