

عناصر الإجابة: الموضوع النموذجي 3 · علوم الحياة والأرض · مناظرة التاسعة

الجزء الأول · أسئلة متعددة الاختيارات (4 ن)

- (1) أ: المخيخ مركز التوازن وتنسيق الحركات.
- (2) ب: البطين الأيسر يدفع الدم المؤكسج في الأهر (الدورة الكبرى).
- (3) ج: الخصيتان تنتجان الحيوانات المنوية بصفة مستمرة منذ البلوغ.
- (4) د: 31 زوجًا من الأعصاب الشوكية تنطلق من النخاع، وكلها مختلفة.

الجزء الأول · مكونات الجهاز العصبي (4 ن)

- (1) 1: المخ · 2: المخيخ · 3: البصلة السيائية · 4: النخاع الشوكي · 5: عصب شوكي · 6: عصب قحفي.
- (2) المركزي: 1، 2، 3 (الدماغ) و 4 · المحيطي: 5 و 6 (الأعصاب).
- (3) البصلة السيائية تصل الدماغ بالنخاع وتحتوي مراكز حيوية (إيقاع التنفس ودقات القلب، البلع، السعال)؛ إصابته خطيرة جدًا لأنها قد توقف التنفس أو القلب.
- (4) العمود الفقري (الغلاف العظمي)، السحايا، السائل الدماغي الشوكي · ارتداء الخوذة.

الجزء الأول · تحديد فصائل الدم (4 ن)

- (1) الارتصاص: تكتل الكريات الحمراء (ثم إلتافها) عند التقاء مولّد ارتصاص بالجسم المضادّ الموافق له.
- (2) سامي: A · ليلي: O · كريم: AB · هالة: B.
- (3) كلّهم (سامي و ليلي وهالة): مصل كريم (AB) لا يحتوي على أيّ جسم مضادّ (مضادّ A أو مضادّ B)، فلا ترتصّ كريات أيّ معطّ: AB آخذ عامّ (مع تفضيل نفس الفصيلة ومراعاة اليزوس).
- (4) كريات سامي تحمل مولّد الارتصاص A، ومصل ليلي (O) يحتوي على مضادّ A ومضادّ B، فترتصّ الكريات المنقولة: خطر على حياة ليلي.

الجزء الثاني · التستوستيرون والبلوغ (5 ن)

- (1) قبل 10 سنوات تكون النسبة ضعيفة جدًا (0,1 إلى 0,2 ng/mL)؛ بين 12 و 16 سنة ترتفع بسرعة (من 1 إلى 5 ng/mL)؛ ثمّ تبلغ قيمة مرتفعة نسبيًا ثابتة تقريبًا (6 ng/mL) في 18 سنة.
- (2) بين 12 و 14 سنة تقريبًا (بعد 10 سنوات): بداية الارتفاع الواضح لنسبة التستوستيرون التي تسبّب تغيّرات البلوغ.
- (3) أ- التستوستيرون، الذي تفرزه الخصيتان، ضروري لظهور الصفات الجنسية الثانوية الذكرية. ب- مثلًا: ظهور شعر الوجه (اللحية والشارب) والإبطيين والعانة، تغيّر الصوت (يصبح أغلظ)، اتّساع الصدر والكتفين ونموّ العضلات، طفرة نموّ.
- (4) إنتاج الحيوانات المنوية (بصفة مستمرة) وإفراز هرمون التستوستيرون في الدم.

الجزء الثاني · تحليل دم (3 ن)

- (1) عدد الكريات البيضاء والصفائح عادي، أمّا عدد الكريات الحمراء (3 ملايين) فأقلّ من العادي: فقر الدم.

- (2) نقص الكريات الحمراء (والهيموغلوبين) يقلل كمية O_2 المنقولة إلى الخلايا، فتتقص الأكسدة الخلوية والطاقة المنتجة (تعب)، ويحاول الجسم التعويض بتسريع التنفّس (ضيق التنفّس).
 - (3) فرضيّة مقبولة: نقص الحديد في الغذاء (أو نزيف متكرّر)، فلا تُصنع كمية كافية من الهيموغلوبين والكريات. نصيحة: تناول أغذية غنيّة بالحديد (الكبد، اللحوم الحمراء، البقول كالعدس...) واستشارة الطبيب.
- عناصر إجابة من إعداد سكولار: تُقبل كلّ صياغة صحيحة أخرى.